



31° ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΔΝΕΥ 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΟ DARLING HARBOUR

(SUBMISSIONS FOR GENERAL NON - FOOD STALLS AND TENDER
FOR FOOD STALLS, COFFEES, SOFT DRINKS AND ALCOHOL)

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΛΕΝΤΙ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΔΝΕΥ
που θα γίνει

Σάββατο και Κυριακή 16-17 Μαρτίου 2013

Οι ενδιαφερόμενοι για την ενοικίαση περιπτέρου και για την υποβολή προσφορών για την πώληση φαγητών, καφέδων, αναψυκτικών και αλκοόλ στο χώρο του Darling Harbour παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το γραφείο του Ελληνικού Φεστιβάλ Σύνδνευ στα 9750 0440 η με e-mail: greekfestival2@goc.com.au
Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε και στην ιστοσελίδα www.greekfestivalofsydney.com.au

Τελευταία ημέρα για κατάθεση των προσφορών και ενοικίαση περιπτέρων είναι η:

14827 Παρασκευή 8 Φεβρουάριου 2013, 5:00 μμ

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ



Η ασπιρίνη... «τυφλώνει»;

Αυξημένο κίνδυνο τύφλωσης φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω π.χ. καρδιακών νοσημάτων, σύμφωνα με νέα μελέτη αυστραλών επιστημόνων.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ με παρουσίασή τους στην επιθεώρηση «JAMA Internal Medicine», η μακροχρόνια λήψη του λευκού χαπού διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρής μορφής - λιγότερο συχνή μορφή της παθώσεως που αγγίζει το 10% των περιπτώσεων.

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρής μορφής προκαλείται από την ανάπτυξη νέων και εύθραυστων αγγείων που διογκώνονται και αιμορραγούν προκαλώντας βλάβες στον αμφιβλοστροειδή χιτώνα. Η προχωρημένη ηλικία, το κάπνισμα και η κληρονομικότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 15ΕΤΙΑΣ

Στη μελέτη των ειδικών έλαβαν μέρος 2.389 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 65 έτη. Οι ερευνητές προχώρησαν σε οφθαλμολογικές εξετάσεις των συμμετεχόντων οι οποίες επαναλαμβάνονταν ανά πενταετία για συνολικά 15 χρόνια.

Στο τέλος της παρατήρησης φάνηκε ότι από τα άτομα που λάμβαναν ασπιρίνη συχνά (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα), το 9,3% εμφάνισε εκφύλιση της ωχράς κηλίδας συγκριτικά με το μόλις 3,7% όσων δεν λάμβαναν ασπιρίνη.

«Ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης εκφύλισης της ωχράς κηλίδας εντοπίστηκε μετά τα 10 έτη λήψης της ασπιρίνης, γεγονός που υποδεικνύει την συσσωρευτική επίδραση του φαρμάκου στον οργανισμό» εξηγούν στη δημοσίευσή τους οι επιστήμονες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος απώλειας της όρασης μετά από πέντε συνεχόμενα έτη συχνής λήψης ασπιρίνης άγγιζε το 1,9%, μετά από 10 χρόνια έφτανε στο 7% ενώ μετά από 15 χρόνια το ποσοστό ανέβαινε στο 9,3%. Αντίθετα, ο κίνδυνος για τα άτομα που δεν λάμβαναν ασπιρίνη ξεκινούσε από το 0,8% στα πέντε χρόνια, ανέβαινε στο 1,6% στα 10 χρόνια και έφτανε μέχρι το 3,7% στα 15 χρόνια.

Από την πλευρά της η βρετανική Εταιρεία Ωχράς Κηλίδας έσπευσε να ανακοινώσει πως: «Οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο υγείας σε περίπτωση που σταματήσουν να λαμβάνουν ασπιρίνη».

QB QUALITY BLINDS
QUALITYBLINDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

A SHADE ABOVE THE REST

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα.

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε παντός είδους blinds.

Ο γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα για καθαρίσμο ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί. Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050

Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.

www.qualityblinds.com.au