

H1n Δεκεμβρίου πμέρα κατά του AIDS

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η HIV/AIDS λοίμωξη στο μικροσκόπιο

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

35,3 εκατ.

άνθρωποι είναι σήμερα φορείς του ιού HIV

2,5 εκατ.

οι νέοι φορείς το 2012

36

εκατ. άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την περίοδο 1981-2012

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Συντόπτη

13.496

τα κρούσματα της HIV/AIDS λοίμωξης από το 1981 έως τις 31 Οκτωβρίου 2013

792

νέα κρούσματα καταγράφηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2013



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ



Σεξουαλικές επαφές



Μολυσμένες σύριγγες



Μετάγγιση αίματος (σπανίως)



Από τη μητέρα στο παιδί

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ



Με το φιλί



Με τα τσιμπήματα εντόμων

Κρούσματα ανά κατηγορία μετάδοσης έως 31/12/2012

Δεν περιλαμβάνονται άτομα στα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης



ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΙΟΥ

HIV-1

Προκαλεί τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο (περίπου το 90%) και έχει τις περισσότερες μεταλλάξεις και υποτύπους

HIV-2

Εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη Δυτική Αφρική, με λίγα περιστατικά σε χώρες που έχουν συχνή επικοινωνία με την περιοχή αυτή (όπως την Πορτογαλία). Τείνει να μεταδίδεται πιο δύσκολα απ' ό,τι ο HIV-1 και η εξέλιξη της νόσου στους φορείς του είναι πιο βραδεία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ AIDS

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Εγκεφαλίτιδα
Μηνιγγίτιδα

MΑΤΙΑ

Φλεγμονή στον αμφιβληστρειδή χιτώνα

ΔΕΡΜΑ


Ογκοί

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

Πνευμονία
Φυματίωση
Ογκοί
Μυκοπιάσεις

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μυκοπιάσεις
οισοφάγου
Χρόνια διάρροια
Ογκοί



Τα στάδια της λοίμωξης

ΣΤΑΔΙΟ 1 ΟΞΕΙΑ

Σχεδόν σε εννέα από τους δέκα ανθρώπους που ήλινονται από τον ιό HIV, εκδηλώνονται 2-4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του κρυολογήματος ή της γρίπης (πυρετός, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, υπνηλία, εάντληση)

ΣΤΑΔΙΟ 2 ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Επί 5-10 χρόνια οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν εμφανή συμπτώματα. Αν, όμως, δεν παρακολουθούνται από τον γιατρό και δεν αρχίσουν εγκάριως θεραπεία, το ανοσοποιητικό τους σύστημα μπορεί να εξασθενήσει σημαντικά και να εκδηλώσουν AIDS

ΣΤΑΔΙΟ 3 AIDS

Το τελευταίο στάδιο της HIV λοίμωξης, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το HIV οροθετικό άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Τα συμπτώματα που εκδηλώνονται σε αυτό το στάδιο σχετίζονται με τις λεγόμενες «ευκαιριακές λοιμώξεις» που εκδηλώνονται στα άτομα με AIDS, όπως η πνευμονία, η φυματίωση και η τοξοπλάσμωση